Naturalientausch

von

Philipp Maximilian Opiz,

corresp. Mitgliede der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn, und wirkendem Mitgliede der Gesellschaft des böhmischen vaterländischen Museums in Prag.

Nro. 1 — 10.

Prag 1823, 1824, und 1825.

In Commission bei Carl Wilhelm Enders.

„Man kann nie zu viele Exemplare aus verschiedenen Ländern „vergleichen, und Spielarten sind nicht zu vernachläßigen."

Nees von Esenbeck in der Flora oder botanischen Zeitung 1818. S. 426.

Erstes Verzeichniß

jener Pflanzen, welche bei P. M. Opiz in Prag, Pflastergasse Nro. 1056, zum Tausch oder Kauf *) unter den im Hesperus — Kratos und der botanischen Zeitung bekannt gemachten Bedingnissen vorräthig sind, und nur dann ausgefolgt werden, wenn alle Einsendungen kostenfrei geschehen, und zur Besorgung der Gegensendungen verhältnißmäßige Geldvorschüße erfolgen. Die Fortsetzung dieses Verzeichnisses folgt nach Erlag von 12 kr. C. M.

Acacia verticillata. Herit. —

Acer spicatum. Lamark. — campestre. L. — platanoides. L. — Pseudoplatanus. L. — tataricum. L. — striatum. Lam. — saccharinum. L. — laciniatum. Hort.

Achillea Millefolium collina. Fl. sax. — Clavennae. L. — lanata. Sprengl. — nobilis. L. — Ptarmica. L. — setacea. W. et K. — compacta. Willd. — Eupatoria. Bstn. — mongolica. — speciosa. Sprengl. — decolorans. Schrad. — grandiflora. Bstn. — Seidlii. Presl. — Ptarmica degener. Nenning.

Achimenes cocinea. Pers.

Achyranthes porrigens. Jacq,

Aconitum Lycoctonum. L. — Napellus. L. — neomontanum. — variegatum. L. — gracile, Reichenb. — Störkeanum. Reichenb.

Acrostichum Ruta muraria. — septentrionale.

Acorus Calamus. L.

Actaea racemosa. L.

Acynos alpinus. Pers. — vulgaris. Pers.

Adianthum Capilus Veneris. L.

Adonis lutea. — aestivalis. L. — vernalis. L.

Adoxa moschatellina. L.

Aecidium crassum Ranunculi. — Epilobii. — Hieracii paludosi. — Pedicularidis. — cornutum. — crassum Ficariae. — Clematitis. Gärtn. — Anemones. — Prenanthis. — Orobi. — punctatum. — Tussilaginis. — Berberidis. Pers. — Euphorbiae. Pers — Sii Falcariae. Pers. Pini. — Rhamni. — Lapsanae. — crassum. Pers. — Orchidis. — Parnassiae. — Aquilegiae. — asperifol. —

*) Die Centurie à 5 fl. C. M., nebst Vergütung aller Unkosten.

Rumicis. — Tragopogi. — Lonicerae. De C. — Cirsii. De C — Ranunculacearum. R. bulbosi. — Lysimachiae.

Aegylops cylindrica. Host. — squarrosa. L.

Aesculus Hippocastanum. L. —

Aethusa Ammi. Spreugl. — Cynapium. L. — elata. Friedl.

Agrimonia Eupatorium. L. — odorata. Miller. —

Agropyrum variegatum.

Agrostemma Cöli Rosa. L. — Githago. L. — niceensis. L.

Agrostie vulgaris pumila. — Spica venti. L. — vulgaris. L. — interrupta. L. — mexicana. L.

Aira caespitosa. L. — aquatica. L. — cariophyllea. L. — flexuosa. L. — canescens. L. — media. Gouan.

Ajuga chamaepytis. L. — genevensis L. — reptans. L.

Alchemilla montana pubescens. Lam. — montana. W. — alpina. L. — Aphanes. L. — vulgaris pratensis. Schmidt.

Alisma Plantago. L.

Allium microcephalum. Tausch. — Scrodoprassum. L. — ursinum L. — angulosum. L. — Schönoprassum. L. — atropurpureum. W. et K. — sibiricum. L. — setaceum. W. et K. — Cepa. L. — obliquum. L.

Alnus glutinosa laciniata. W. — glutinosa. Gärtn. — serrulata. W.

Alopecurus pratensis. L. — geniculatus. L. — ventricolatus. Pers. — nigricans. Hornem.

Allosurus crispus.

Alphitomorpha lamprocarpa.

Alsine viscosa. Schreb. — media. L.

Alyssum campestre. L. — incanum. L. — saxatile. L. — tortuosum. W. et K. — hirsutum. M. Bst.

Amaranthus retroflexus pusillus. Opiz. — Berchtoldii. Seidl. [1]) — caudatus. L — flavus. L. — mangostanus. L. — sanguineus. L. — tristis. L. — bicolor. Nocca.

Ammi majus. L.

Amorpha pubescens. W. — fruticosa. L.

Amphidium pulvinatum.

Amygdalus Persica. L.

Anacyclus clavatus. Pers.

---

*) Amaranthus glomerulis triandriss axillaribus sessilibus, calicibus acutis, foliis ovatis, acuminatis, caule basi ramoso erecta. Opiz, Pragae. (Seidl.)

Anagallis arvensis. L.

Anchusa ochroleuca. Bstn. — paniculata. Aiton.

Andreaea alpina.

Andromeda polifolia. L. — calyculata. L.

Andropogon angustifolius. Sib. et Sm. — Ischaemum. L. — Allionii. De C. —

Androsace elongata. Rez. — lactea. L. — chamaejasme. Wulf. — septentrionalis. L. — villosa. L.

Andryala cheiranthifolia, Herit.

Anemone nemorosa. L. — ranunculoides. L. — sylvestris. L. — alpina. L.

Angelica sylvestris. L.

Anöctangium caespitosum. — Hornschuchianum.

Anthemis coronopifolia. W. — fuscata. Broter. — mixta. L. — arabica. L. — ruthenica. Bieberst.

Anthericum Liliago. L. — annuum. L.

Anthoxanthum odoratum. L. — odoratum pubescens. Opiz.

Anthyllis Barba Jovis. L. — montana. L. — tetraphylla. L. — Vulneraria. L.

Antirrhinum majus. L. — Orontium. L. — alpinum. L. Elatine. L. — repens. — triphyllum. — bipartitum.

Apargia alpina. Jacq. — autumnalis. L. — hastilis. L. — hispida. L. — incana. Scopol.

Apium graveolens. L. — Petroselinum. L.

Apocymum hypericifolium. Aiton.

Aquilegia canadensis. — hirsuta.

Arabis arenosa. Scopol. — Halleri. L. — hispida. L. — nutans. Mönch. — procurrens. W. K. — thaliana. L. — caucasica. W.

Arctium majus. Thuill. — tomentosum. Pers.

Arctotis aspera. W.

Arenaria fasciculata. L. — heteromalla. Pers. — marina. Smith. — polygonoides. Wulf. — rubra. L. — tenuifolia. L. — trinervia. L. — verna. L. — viscosa Thuillier. — balearica. L. — grandiflora. L. — striata. L.

Aristolochia Clematitis. L. — Sipho. Heritier.

Armeria littoralis. — plantaginea.

Arnica Scorpioides. L.

Arnopogon picroides. L.

Artemisia Absinthium. L. — austriaca. Jacq. — campestris L. — camphorata. Villars. — Dracunculus. L. —

cialis. L. — monogyna. W. K. — mutellina. Vill. — pontica. L. — vulgaris. L. — Sierversiana. Ehrh.

Arundo Phragmites. L. — Langsdorfii.

Asarum europaeum. L.

Asclepias virgata. — syriaca.

Asparagus officinalis.

Asperugo procumbens. L.

Asperula arvensis. L. — longiflora. W, K. — taurinensis. L. — tinctoria. L. — odorata. L. — cynanchica. L.

Aspidium Lonchitis. — Oreopteris. — Thelipteris. — rigidum — spinulosum. — Filix fömina. — aculeatum. — tanacetifolium. — alpestre.

Asplenium Trichomanes. — Adianthum nigrum. — Ruta muraria. — viride.

Aster amygdalinus. Lam. — angustifolius. Jacq. — eminens. W. — glastifolius. — praecox. W. — rubricaulis. Lam. — alpinus. L. — Amellus. L. — canus. W. et K. — pannonicus. Jacq. — punctatus. W. K. — Tripolium. L. — ericoides. L. — cordifolius. L. — fragilis. — linariaefolius. L. — macrophyllus. L. — multiflorus. Aiton. — novaeangliae. L. — patens. Aiton. — puniceus. L. — chinensis. L. — heterophyllus. W. — bellidiflorus. W. — linifolius. L. — laevigatus. W. — pallens. W.

Astragalus Onobrychis alpinus. Vill. — pilosus. L. — austriacus. L. — Cicer. L. — exscapus. L. — glyciphyllos. — montanus. L. — Onobrychis. L. — Hypoglottis. —

Astrantia major. L. — Epipactis. L.

Athanasia annua. L.

Atheropogon apludoides. Mühlenb.

Athyrium Filix fömina. Roth. — fragile. — alpinum.

Atraphaxis spinosa. L.

Atriplex oblongifolium. W. et K. — angustifolia. Smith. — rosea. L. — nitens. Rebent. — pedunculata. L. — sibirica. L.

Atropa physaloides. L. —

Avena nuda chinensis. Fischer. — praecox. Beauv. — orientalis. Schreber. — fragilis. L. — brevis. Roth. — alpestris. — pubescens. — fatua. L. — sterilis. L. — hirsuta. Roth.

Azalea procumbens. L.

Ballota nigra. L.

Balsamita suaveolens. P.